


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



TESIS DE GRADO

“Características epidemiológicas, clínicas y quirúrgicas del embarazo ectópico en el Hospital Antonio Lorena, Cusco 2010-2014”

PRESENTADO POR:

ROXANA MAMANI RAMOS

TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE:

MEDICO CIRUJANO

ASESOR:

Md. JUAN JOSE PALOMINO DELGADO

CUSCO- PERU

2015

Resumen

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS Y QUIRÚRGICAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN EL HOSPITAL ANTONIO LORENA 2010-2014

Objetivo: La presente investigación tuvo como objetivo determinar las características epidemiológicas, clínicas y quirúrgicas en el embarazo ectópico en el Hospital Antonio Lorena 2010-2014. **Método y Población:** Es un estudio tipo observacional, descriptivo, retrospectivo; cuyo grupo son todas las pacientes diagnosticadas de embarazo ectópico atendidas en el Hospital Antonio Lorena periodo 2010 – 2014. **Resultados:** Se estudió 156 pacientes con edades entre 14 y 44 años donde la incidencia de embarazo ectópico en el Hospital Antonio Lorena fue de 1.60% en el año 2010, 1.48% en el año 2011, 1.48% en el año 2012, 1.41% el año 2013, 1.48% el año 2014, respecto al número total de partos. El embarazo ectópico es más frecuente en mujeres de 21 a 30 años de edad, con grado de instrucción secundaria, residentes en área urbana, convivientes. El síntoma más frecuente fue el dolor pélvico (94.9%), la edad gestacional fue menor o igual a 5 semanas (31.4%). Respecto a la edad de inicio de relaciones sexuales fue frecuente en menores de 19 años de edad, la mayoría de las pacientes fue multigesta. Antecedente de EPI estuvo presente en 3%, no usaban ningún anticonceptivo el 75%, antecedente de aborto 34%, antecedente de ETS presente en 1.3%, antecedente de embarazo ectópico presente en 3%, antecedente de cirugía pélvica presente en 11%. de implantación del embarazo ectópico fue frecuente en la trompa con 93.6% en región ampular, la afección lateral más frecuente fue el lado derecha. El hallazgo quirúrgico fue el embarazo ectópico complicado más frecuente (90%), y el tratamiento realizado más frecuente fue la salpingectomía.

Summary

EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL AND SURGICAL ECTOPIC PREGNANCY HOSPITAL ANTONIO LORENA 2010-2014

Objective: This research aimed to determine the epidemiological, clinical and surgical in ectopic pregnancy in the Antonio Lorena Hospital 2010-2014. **Population and method:** An observational, descriptive, retrospective study; whose group are all patients diagnosed with ectopic pregnancy treated at the Hospital Antonio Lorena period 2010 - 2014. **Results:** 156 patients aged between 14 and 44 years where the incidence of ectopic pregnancy in the Antonio Lorena Hospital was 1.60% in 2010, 1.48% in 2011, 1.48% in 2012, 1.41% was studied 2013, 1.48% by 2014, relative to the total number of births. Ectopic pregnancy is more common in women aged 21-30 years, with high school degree, living in urban areas, partners. The most common symptom was pelvic pain (94.9%), gestational age was less than or equal to 5 weeks (31.4%). Regarding the age of first sexual intercourse was common in children under 19 years of age, most of the patients was multigesta. History of EPI was present in 3% did not use contraception 75%, history of abortion 34%, history of ETS present in 1.3%, previous ectopic pregnancy present in 3%, previous pelvic surgery present in 11%. With respect to the implantation of ectopic pregnancy was common in the trunk with 93.6% in ampullary region, the most frequent condition was the right lateral side. The surgery was the most frequent finding complicated ectopic pregnancy (90%), and treatment was performed more frequently salpingectomy.