

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL
CUSCO**

**FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL BAJO PESO AL NACER
EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL ANTONIO
LORENA DEL CUSCO 2016**

Presentado por:

Bach. LÓPEZ QUISPE MAYRA GABRIELA

Bach. QUISPE MAÑACCASA WILMER

**PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE
LICENCIADOS EN ENFERMERÍA**

ASESOR:

Dr: NICASIO QUISPE SUNI

CUSCO – PERÚ

2016

RESUMEN

El presente trabajo titulado: “FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL BAJO PESO AL NACER EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA DEL CUSCO 2016”. **Objetivo:** Determinar los factores asociados con el bajo peso al nacer en recién nacidos del Hospital Antonio Lorena del Cusco 2016. **Materiales y métodos:** Estudio de tipo analítico observacional, caso – control. Fueron incluidos todos los nacidos vivos de bajo peso en el año 2016 en un total de 305, de los cuales por muestreo aleatorio simple para casos y controles se obtuvieron 40 casos y 80 controles en una proporción de 1/2. Para la recolección de datos se utilizó una Lista de chequeo que fue validada mediante juicio de expertos. Para el procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 20 aplicándose el estimado OR con el intervalo de confianza del 95%. **Resultados:** En los factores perinatales: Edad gestacional OR=15.64 (IC: 5.75-42.55) $p= 0.000$, Hipertensión arterial durante el embarazo OR= 9.75 (IC: 1.96-48.45) $p= 0.001$, Ruptura prematura de membranas OR=6.33 (IC: 1.84-21.76) $p= 0.001$, Hemorragias OR= 5.57 (IC: 1.03-36.12) $p= 0.028$, Controles pre-natales OR= 2.71 (IC: 1.22-6.05) $p= 0.013$. Entre los factores maternos: Antecedentes de hijo con bajo peso al nacer OR= 1.54 (IC: 0.33-7.24) $p= 0.028$, Edad materna OR= 3.03 (IC: 1.38-6.67) $p= 0.005$, Periodo intergenésico OR= 3.40 (IC: 1.28-9.05) $p= 0.011$ y Estado nutricional materno OR= 2.71 (IC: 0.69-10.73) $p= 0.141$. **Conclusiones:** Los factores de riesgo que influyen en el bajo peso al nacer son: Edad gestacional entre 24 y 36 semanas, Hipertensión arterial durante el embarazo mayor igual a 140/90 mmHg, Ruptura prematura de membranas, Hemorragias, Edad materna entre 14-19 y 35-44 años de edad, Controles prenatales entre 1 y 5, Periodo intergenésico menor a 24 y mayor a 60 meses.

PALABRAS CLAVE: Bajo peso al nacer, recién nacido, factores de riesgo perinatales y factores de riesgo materno