

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ciencias de la Salud
Escuela Profesional de Medicina



Tesis:

“Factores Maternos Asociados a Parto Pretérmino en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, 2018”

Presentado por:

Uñapillco Uñuruco Franklin Kenyo

Tesis para optar El Título Profesional De:

Médico Cirujano

Asesor:

Dr. Nicolás Edgardo Mauricio Agurto

Cusco - Perú – 2019

Resumen

“Factores Maternos Asociados a Parto pretérmino en el Hospital Antonio Lorena Cusco, 2018” Franklin K Uñapillco,

Objetivo: Analizar los factores maternos asociados a parto pretérmino en el hospital Antonio Lorena del Cusco, 2018.

Métodos: Estudio de casos y controles. Realizado en el Hospital Antonio Lorena del Cusco se realizó análisis observacional de las variables categóricas; como análisis bivariado entre los posibles factores asociados con la variable de interés “pretérmino”, para lo cual se calcularon los odds ratio (OR), con sus respectivos IC al 95%. Se consideró significativos los valores $p < 0,05$.

Resultados: De los 3125 partos, 262 partos fueron prematuros. Obteniéndose una prevalencia del 8,4% de partos prematuros, de estos fueron de moderado a tardío 77,40%, muy prematuro 17,30%, extremo 5,30%. Estado civil 28% solteras en pretérmino $P=0,000$ $OR=9,333$ $IC=2,647$ a $32,908$. Grado de instrucción primaria 26,7% $P=0,001$ $OR=5,091$ $IC=1,796$ a $14,427$. Ocupación el 65,3% ama de casa y 34,7 fuera de casa $P=0,027$ $OR=0,433$ $IC=0,204$ a $0,916$. Intervalo intergenesico inadecuado 52,2% $P=0,008$ $OR=3,273$ $IC=1,338$ a $8,006$. Procedencia urbana son el 58,7% y rural el 41,3% OR 0,3. Parto pretérmino previo el 17,3% tiene como antecedente algún parto pretérmino, el 82,7% no tiene dicho antecedente $P=0,000$ $OR=2,210$ $IC=1,838$ a $2,657$. Antecedente de Aborto el 26,7% tiene como antecedente algún aborto previo, el 73,3% no tiene como antecedente algún aborto previo $P=0,001$ $OR=5,091$ $IC=1,796$ a $14,427$. Controles prenatales 66,7% tiene menos de 6 controles prenatales, el 33,3% tiene 6 o más controles prenatales $P=0,000$ $OR=23$ $IC=8,785$ a $60,219$. RPM 34,7% presento RPM, el 65,3% no presento RPM $P=0,000$ $OR=9,418$ $IC=3,092$ a $28,688$. Anemia el 38,7% presento anemia durante la gestación, el 61,3% no presento anemia durante la gestación $P=0,007$ $OR=2,747$ $IC=1,306$ a $5,780$.

Conclusiones: factores riesgo sociodemográficos para parto pretérmino más relevantes son en orden descendente el estado civil, grado de instrucción y ocupación. Entre los antecedentes obstétricos los factores asociados más relevantes en orden descendente son el tener un control prenatal inadecuado, tener un aborto previo, tener un parto prematuro previo y periodo intergenesico inadecuado. Dentro de las patologías que se presentan durante el embarazo y de acuerdo los factores asociados más relevantes en orden descendente son ruptura prematura de membranas y la anemia materna.

Palabras Clave: Parto pretérmino, Factores Asociados, ruptura prematura de membranas.