

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA**



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA PÉRDIDA DENTAL
DE PRIMEROS MOLARES PERMANENTES EN ALUMNOS DE
6-12 AÑOS DE LA I.E. 51025, ANTA; CUSCO-2018**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO
PROFESIONAL DE:**

CIRUJANO DENTISTA

PRESENTADA POR:

Bach. YONY DANNA DAYELI
CHAMBI HUILLCA

ASESOR:

C.D. ESP. FREDY VICTOR
MENDOZA CANALES

CUSCO-PERU

2019

RESUMEN

Introducción: El primer molar permanente es considerado como la unidad más importante con respecto a la masticación y al desarrollo de una oclusión funcionalmente deseable. La pérdida de este molar a temprana edad en un niño ocasionará disminución en la función local, extrusión de la pieza antagonista, desviaciones de las piezas dentarias y trastornos de las articulaciones temporomandibulares, entre otras alteraciones. **Objetivo:** Determinar los factores de riesgo asociados a la pérdida dental de primeros molares permanentes en alumnos de 6-12 años de la I.E. 51025, Anta; Cusco-2018. **Material y métodos:** El presente estudio es descriptivo de factor asociado, transversal y observacional, la muestra estuvo conformada por 200 alumnos de 6 a 12 años de edad que se encontraron cursando el año lectivo del 2018 en la I.E. 51025 de la provincia de Anta, quienes fueron evaluados de acuerdo a los criterios usando como instrumento: encuesta, ficha clínica odontológica, consentimiento informado, asentimiento informado. **Resultados:** Los factores de riesgo asociados con la pérdida dental de los primeros molares permanentes en niños fueron el grado de instrucción del padre con un $P=0,001$, la frecuencia de cepillado dental con un $P= 0,012$ y índice de higiene oral con un $P= 0,001$; y no existiendo asociación con el factor estilos de vida y factor sociocultural en edad del padre e ingreso mensual. **Conclusión:** Los factores de riesgo asociados con la pérdida dental de primeros molares permanentes en niños fueron el grado de instrucción del padre, la frecuencia del cepillado dental y en índice de higiene oral.

Palabra clave: *Pérdida del primer molar permanente, factores de riesgo, asociación, niños.*