

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL  
CUSCO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA.**



**GINGIVITIS EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE  
SALUD SAN PEDRO, CUSCO - 2018.**

TESIS PARA OPTAR EL TITULO  
PROFESIONAL DE CIRUJANO  
DENTISTA.

**AUTOR:**

Bach. ROGER PFURO VETANCUR.

**ASESORA:**

Dra: YAHAIRA PAOLA VARGAS  
GONZALES.

**CUSCO - PERÚ**

**2018**

## RESUMEN

**Introducción:** El embarazo conlleva a una serie de cambios, fisiológicos y de conducta que repercuten en la cavidad bucal, lo que hace a la gestante más vulnerable a padecer patologías bucales como la gingivitis.

**Objetivo:** Determinar el grado de gingivitis en gestantes atendidas en el Centro de Salud San Pedro, Cusco - 2018.

**Material y Método:** Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, transversal a una muestra de 103 gestantes, mayores a 12 años, que estuvieron en los tres trimestres de gestación. Se descartaron aquellas gestantes con enfermedades sistémicas, o que estuvieran bajo tratamiento medicamentoso. Se utilizó la técnica de observación clínica directa para establecer la gingivitis a través del índice Gingival de Loe y Silnes Simplificado.

**Resultados:** La presencia de gingivitis en gestantes Cusqueñas fue alta, donde predominó la gingivitis moderada con 59.2%, seguido por la gingivitis severa con 33.0% y leve de 7.8%. Durante los tres trimestres predominó la gingivitis moderada, siendo mayor en el primer y segundo trimestre de gestación. Las multigestas, presentaron un predominio de la gingivitis moderada, con 33.01%. Según edad, se encontraron que en los tres grupos etarios predominó la gingivitis moderada, siendo el grupo etario de 30 – 42 años el más afectado con 32.04%. Según grado de instrucción se encontraron que la mayoría de las gestantes tenía secundaria completa con predominio de la gingivitis moderada de 28.16%.

**Conclusiones:** El grado de gingivitis en gestantes, fue alto, con mayor predominio de la gingivitis moderada. Según trimestre de gestación fue mayor la moderada en el primer y segundo trimestre de gestación. El grupo más afectado fue las multigestas. Según edad fue mayor la moderada en todos los grupos etarios.

**PALABRAS CLAVES:** Gingivitis, gestantes.