

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Facultad de Ciencias de la Salud

Escuela Profesional de Medicina Humana



TESIS DE INVESTIGACIÓN

**“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS-QUIRÚRGICAS Y SUPERVIVENCIA
DEL CÁNCER DE TIROIDES, HOSPITAL NACIONAL ADOLFO
GUEVARA VELASCO, CUSCO 2010 - 2015”**

**Presentado por: Bach Luz Nelida Morales Concha
Para optar el título profesional de Médico Cirujano**

Asesor: Edward Luque Flórez

Co-asesor: Alexis Chávez Echevarría

Cusco, marzo del 2020

RESUMEN

“Características Clínicas-Quirúrgicas y supervivencia del cáncer de tiroides, Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, cusco 2010 - 2015”

Morales Concha, L

Introducción: Durante las últimas décadas, la incidencia de cáncer de tiroides ha aumentado notablemente en países como Estados Unidos, Corea del Sur, Reino Unido y en varios países europeos. Es el cáncer con el aumento más rápido y si se mantiene sus tendencias actuales, será el cuarto cáncer más común en 2030. Objetivo: Conocer las características clínicas-quirúrgicas y supervivencia del cáncer de tiroides en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, 2010 – 2015.

Métodos: Se realizó un estudio de tipo observacional, retrospectivo. Se estudiaron a todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de tiroides en el periodo de estudio. La recolección de datos se realizó mediante el instrumento elaborado en base a las variables del estudio. Se describió las características clínicas-quirúrgicas del cáncer de tiroides y también se analizó las características clínicas y quirúrgicas que influyen en la supervivencia de cáncer de tiroides.

Resultados: De la población estudiada, la edad media al diagnóstico de 48.6 +/- 12.82 años, existiendo un claro predominio femenino (85.62%). El 53.95% de los pacientes fue diagnosticado mediante BAAF. Como presentación función tiroidea inicial más frecuentes fueron hipotiroidea (35.95%) y eutiroidea (60.78%). La forma de presentación más frecuente fueron de nódulo tiroideo único (39.22%) y como hallazgo incidental el 30.07%. El 45.10% de los pacientes presentaron síntomas no relacionados y como síntoma más frecuente fue de dolor de la región del cuello (25.49%). El tipo histológico más frecuente fue el papilar en un 92.81%, seguido del folicular en un 5.23%. Como subtipos histológicos del papilar los más frecuentes fueron el subtipo clásico (36.62%) y la variante folicular (36.62%). El 70.59% de los pacientes fue tratado quirúrgicamente tiroidectomía total y el 29.41% se practicó hemitiroidectomía. La supervivencia global a los 5 y 10 años de seguimiento fue 88.2% y 82.7%, respectivamente.

Conclusiones: En nuestra población, el cáncer de tiroides tiene un marcado predominio en el sexo femenino y en mayores de 42 años, la presentación histológica más frecuente fue el carcinoma papilar con su variante folicular. La supervivencia global a los 5 y 10 años de seguimiento fue 88.2% y 82.7%, respectivamente.

Palabras clave: Cáncer de tiroides; Carcinoma diferenciado de tiroides; Supervivencia; (Fuente: DesCS BIREME)