

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



TESIS
“FACTORES ASOCIADOS A PSORIASIS EN PACIENTES DEL HOSPITAL NACIONAL
ADOLFO GUEVARA VELASCO, CUSCO, 2017 AL 2019”

Presentado por: Bryan Villaca Laura

Para optar el Grado Académico de Médico Cirujano

Asesor: Dr. Manuel Montoya Lizárraga

Co- Asesor: Dra. Olga Paredes Talavera

CUSCO, ENERO – 2020

RESUMEN

“FACTORES ASOCIADOS A PSORIASIS EN PACIENTES DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO, CUSCO, 2017 AL 2019”

Villaca Laura B.

Objetivo: Determinar los factores asociados a psoriasis en pacientes del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, Cusco, 2017 al 2019.

Materiales y métodos: Estudio de tipo casos y controles, retrospectivo, analítico y transversal (120 casos y 120 controles) realizado en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco. Se realizó análisis descriptivo de las variables categóricas y numéricas; así como análisis bivariado y multivariado.

Resultados: se encontró que el 62.08% (N=149) de la muestra son de sexo masculino y el 37.91% (N=91) son de sexo femenino. el 89.17% (N=214) son del sector urbano y 10.83% (N=26) del sector rural, según el tipo de psoriasis que el 89.17% es la psoriasis vulgar, el 6.6% representa la psoriasis gotosa, el 3.83% es la eritrodermica y la psoriasis pustulosa en menor proporción de 0.8%. Al análisis bivariado se encontró que: el IMC con OR=1.2517 p=0.000 IC 95% (1.12 - 1.39), Obesidad 10.83% vs 89.16% OR=3.94 p=0.001 IC 95% (3.58 - 11.7), Sobrepeso 58.3% vs 22.5% OR=6.4 p=0.000 IC 95% (3.58 - 11.70), Dislipidemia 57.5% VS 42.5% OR=6.6 p=0.000 de IC (95% 3.64 – 11.96), Triglicéridos OR= 2.12 p=0.000 de IC 95% (1.55 - 2.90), LDL con un OR= 2.60 p=0.000 de IC 95% (1.8435 - 3.6946), HDL OR= 0.3283 p=0.000 de IC 95% (0.163 - 0.66), la frecuencia de consumo de alcohol 36.6% vs 21.6% con un OR=1.946 p=0.023 de IC 95% (1.09 - 3.45). DM2 con una frecuencia de 13.3% vs 12.5% OR=0.9321 p=0.085 de IC 95% (0.44 – 1.94) y HTA con una frecuencia de 32.5% vs 22.5% OR=1.65 p=0.084 de IC 95% (0.93 – 2.94) mostraron no tener una asociación significativa.

Conclusiones: La psoriasis vulgar predomina en un gran porcentaje del 89%, dentro de los factores de riesgo asociados se tienen consumo de alcohol, IMC (sobrepeso), dislipidemia (LDL y triglicéridos), y como factor protector al HDL. Al análisis multivariado se observa que el sobrepeso incrementa 4 veces más la frecuencia de tener psoriasis.

Palabras Clave: Psoriasis, IMC, consumo de alcohol, dislipidemia, HTA y DM.