

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



“Factores asociados a Sífilis Congénita en el Hospital Regional del
Cusco, 2013-2018”

Presentado por:
Willian Antom Pérez Oviedo

Para optar el Título Profesional de Médico Cirujano

Asesor:
Dr. Félix Alfonso Hidalgo Ramírez

Cusco, 2020

RESUMEN

Introducción: La Sífilis es una infección causada por la espiroqueta *Treponema pallidum*. Es transmitida por vía sexual y también, durante la gestación, de la madre infectada al feto. **Objetivo:** Comparar, asociar y medir la fuerza de asociación de los factores sociodemográficos y antecedentes personales maternos, así como los factores obstétricos-conductuales de los grupos de casos y controles de los recién nacidos atendidos en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional del Cusco en el periodo comprendido entre 2013 a 2018. **Materiales y Métodos:** Se realizó un estudio epidemiológico con diseño de casos y controles; nivel relacional, cuantitativo; tipo observacional, retrospectivo, transversal y analítico. Se encontraron 54 casos de Sífilis Congénita y se definió el grupo control como 54 binomios madre-hijo seleccionados de la población total atendida en los Servicios de Neonatología y Maternidad. **Resultados:** La edad materna promedio es 28.6 años para los casos y 27.3 para los controles, el grado de instrucción es predominantemente secundaria para ambos grupos, el estado civil predominantemente conviviente en ambos grupos, la procedencia rural para los casos y urbano para los controles, la edad de inicio de relaciones sexuales en promedio 16.1 años para los casos y 16.6 para los controles, el número de consultas prenatales de 6.7 y 6.8 para los casos y controles respectivamente, el inicio del control prenatal en promedio 14.6 y 18.3 semanas respectivamente y la primera serología para Sífilis en el tercer trimestre y puerperio para los casos y primer y segundo trimestre para los controles. **Conclusiones:** Las variables grado de instrucción bajo, número de parejas sexuales mayor a 2, número total de embarazos mayor a 2 y primera serología para Sífilis tardía presentan significancia estadística ($p < 0.05$) por lo que constituyen factores asociados para Sífilis Congénita en el Hospital Regional de Cusco entre los años 2013 a 2018. **Palabras clave:** Sífilis Congénita, Sífilis Gestacional, Factores asociados.