

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco

Facultad de Ciencias de la Salud

Escuela Profesional de Medicina Humana



Trabajo de tesis

**“FACTORES ASOCIADOS A LA ANEMIA POSPARTO EN PACIENTES
PUÉRPERAS DEL HOSPITAL DE CONTINGENCIA ANTONIO LORENA, 2018 –
2019”**

Presentado por: Cusi Mamani Erik Víctor

Para optar el título profesional de médico cirujano

Asesor: M.C. Cárdenas Alarcón Wilbert Segundo

Cusco – Marzo, 2020

RESUMEN

“FACTORES ASOCIADOS A LA ANEMIA POSPARTO EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA ANTONIO LORENA, 2018 – 2019”

Cusi E. Víctor

Cárdenas W. Segundo

Objetivo: Establecer los factores asociados a la anemia post parto en el Hospital de Contingencia Antonio Lorena, 2018 – 2019.

Métodos: Se realizará un estudio analítico, retrospectivo, transversal de tipo caso – control. Se [investiga](#) si estuvieron expuestos o no a un determinado factor de riesgo y/o de protección. El tamaño de muestra resulta de 167. Con 56 casos y 112 control los que se seleccionaron de forma aleatoria.

Resultados: De las 23 variables estudiadas se encontraron como factores de riesgo: la variable primiparidad ($P = 0.0473$, $OR=1.9333$, $IC: 1.0080 - 3.7081$), variable sangrado desde la cavidad del útero ($P < 0.0001$, $OR=5.3222$, $IC: 2.6193 - 10.8167$), complicación durante y/o posparto ($P < 0.0001$, $OR=5.1951$, $IC: 2.5371 - 10.6380$); como factores de protección: vía baja de parto (vaginal) ($P = 0.0051$, $OR=0.3851$, $IC: 0.1975 - 0.7511$), grado de instrucción superior ($P = 0.0452$, $OR=0.4570$, $IC: 0.2128 - 0.9836$).

Conclusiones: la primiparidad, sangrado desde la cavidad del útero, complicación durante y/o posparto son factores de riesgo asociados a la anemia posparto, vía baja de parto (vaginal), grado de instrucción superior, son factores de protección asociados a la anemia posparto.

Palabras clave: Anemia, Puerperio, Hemoglobina

ABSTRACT

“FACTORS ASSOCIATED WITH POST-POST ANEMIA AT THE HOSPITAL DE CONTINGENCIA ANTONIO LORENA, 2018 – 2019”

Cusi E. Víctor

Cárdenas W. Segundo

Objective: To establish the factors associated with postpartum anemia at the Antonio Lorena Contingency Hospital, 2018 - 2019.

Methods: An analytical, retrospective, cross-sectional case-control study will be carried out. It is investigated whether or not they were exposed to a certain risk and / or protection factor. The sample size is 167. With 56 cases and 112 controls, those were randomly selected.

Results: Of the 23 variables studied, risk factors were found: the primary variable ($P = 0.0473$, $OR = 1.9333$, $CI: 1.0080 - 3.7081$), variable bleeding from the uterine cavity ($P < 0.0001$, $OR = 5.3222$, $CI : 2.6193 - 10.8167$), complication during and / or postpartum ($P < 0.0001$, $OR = 5.1951$, $CI: 2.5371 - 10.6380$); as protective factors: low birth (vaginal) ($P = 0.0051$, $OR = 0.3851$, $CI: 0.1975 - 0.7511$), higher education level ($P = 0.0452$, $OR = 0.4570$, $CI: 0.2128 - 0.9836$).

Conclusions: primiparity, bleeding from the uterus cavity, complication during and / or postpartum are risk factors associated with postpartum anemia, low birth (vaginal), degree of higher education, are protective factors associated with postpartum anemia

Key words: Anemia, Puerperium, Hemoglobin.