

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



TESIS DE GRADO

“CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS, CLINICO-QUIRURGICAS DEL PACIENTE ILEOSTOMIZADO Y COLOSTOMIZADO MAYOR DE 14 AÑOS, HOSPITAL ANTONIO LORENA, CUSCO, 2015-2019”

PRESENTADO POR:

BACH. MAGALY GABRIELA BALLON SEGOVIA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO

ASESOR:

MGT. EDWARD LUQUE FLÓREZ

CUSCO-PERÚ, 2020

RESUMEN

“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLOGICAS, CLINICO-QUIRURGICAS DEL PACIENTE ILEOSTOMIZADO Y COLOSTOMIZADO MAYOR DE 14 AÑOS, HOSPITAL ANTONIO LORENA, CUSCO, 2015-2019”

Ballón Magaly, Luque Edward. **Métodos:** Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. Se utilizó ficha de recolección de datos. El análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico SPSS v26.0, se utilizó estadística descriptiva con frecuencias, medias y tendencia central. **Resultados:** se incluyeron 105 pacientes. Respecto a las características epidemiológicas, la edad promedio fue de $59,82 \pm 14,7$ años, de sexo masculino (78,10%), de grado de instrucción primaria (42,9%), casados (60%), de la provincia Cusco (27,5%), de ocupación agricultor (68,5%). En cuanto a las características clínicas, el tiempo de enfermedad fue mayor de 1 día, el 61% no tenía antecedente de cirugía abdominal previa, HTA como comorbilidad (5,7%). Dentro de las características quirúrgicas, la cirugía de emergencia fue la más frecuente (81,9%), la indicación principal fue por vólvulo de sigmoides (55,2%) seguido del cáncer colorrectal (16,2%). El tiempo operatorio fue mayor a 120 minutos, la mayoría fueron sometidos a colostomía (78,10%). El 20% fueron ileostomías terminales y el 1,9% en asa. El 66,7% de colostomías fueron tipo Hartmann y el 11,4% en asa. El 83,8% fueron ostomías temporales. El 49,5% presentaron complicaciones, siendo la más frecuente la sepsis (35,2%). La complicación relacionada a la ostomía fue la protrusión (7,6%). El tiempo de estancia hospitalaria fue entre 5-10 días, el 56% no se realizaron restitución del tránsito intestinal, la mortalidad fue de 11,4 %. **Conclusiones:** En nuestra población, la edad promedio fue de 59,82 años, de sexo masculino, de educación primaria, casados, procedencia fuera de la provincia del Cusco, ocupación agricultor. Tiempo de enfermedad mayor de 1 día, sin cirugía abdominal previa, Hipertensión Arterial como comorbilidad. Fueron cirugías de emergencia, por vólvulo sigmoides, tiempo operatorio mayor a 120 minutos. Se realizaron mayormente colostomías, según la técnica quirúrgica se utilizó la ileostomía terminal y la colostomía tipo Hartmann. Fueron ostomías temporales. La principal complicación postoperatoria fue la sepsis, mientras de la ostomía fue el prolapso. Estancia hospitalaria entre 5 a 10 días, la mayoría de pacientes no tuvieron restitución del tránsito intestinal. La mortalidad fue de 11,4%. **Palabras clave:** ileostomía, colostomía, epidemiología; (Fuente: DeCS BIREME)