

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO”

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA



TESIS

**FACTORES PROTECTORES Y DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS(AS)
DE 1 A 6 MESES EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN SALVADOR – CUSCO –
2020**

PRESENTADO POR:

Bach. ALEXANDRA LUCERO HUAMANÍ CCOPA

Bach. JOANA VIANCA VALENZUELA GUZMÁN

**PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADAS EN ENFERMERÍA**

ASESORA:

Dra. ROSA MARÍA JAVIER RAMOS

CUSCO – PERÚ

2021

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo general establecer el grado de protección de la lactancia materna y la estimulación temprana sobre el desarrollo psicomotor en niños(as) de 1 a 6 meses en el Centro de Salud de San Salvador - Cusco - 2020.

MÉTODOS: El nivel de investigación fue descriptivo, correlacional de tipo transversal. La población de estudio estuvo conformada por 48 niños de 1 a 6 meses de edad que acudieron a su control de crecimiento y desarrollo en el Centro de Salud de San Salvador. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) validado por el MINSA para su aplicación, una guía de observación de la lactancia y una guía de observación de la estimulación temprana, todos validados por un juicio de expertos que evidenció que ambas guías son adecuadas en gran medida. La confiabilidad obtenida de los instrumentos mediante el test Kuder Richardson fue de 0.790, 0.710 y 0.701 respectivamente por lo cual instrumentos son confiables con un valor >0.7 . La información recolectada se procesó en gráficos y tablas, usando el programa estadístico SPSS versión 26 y la prueba estadística de Chi cuadrado.

RESULTADOS: Los resultados fueron los siguientes: La lactancia materna como factor protector del desarrollo psicomotor obtuvo un Chi-cuadrado de $X^2=0.017$ para frecuencia y $X^2=0.002$ para la técnica, valores que indican un grado de protección alto debido a que son <0.05 (valor de significancia). La estimulación temprana como factor protector del desarrollo psicomotor obtuvo un Chi cuadrado de $X^2=0.001$ debido a que el valor obtenido es menor al valor de significancia (<0.05).

CONCLUSIONES: Por lo tanto, se afirma la hipótesis planteada: El grado de protección de la lactancia materna y la estimulación temprana sobre el desarrollo psicomotor de los niños(as) de 1 a 6 meses en el Centro de Salud de San Salvador - Cusco – 2020 es alto.

Palabras Claves: Desarrollo Psicomotor, factores protectores, lactancia materna, estimulación temprana, niños(as).