

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**



---

**LESIONES DÉRMICAS POR USO DE ADHESIVOS SANITARIOS  
RELACIONADAS A LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS  
PACIENTES EN SERVICIOS DE INTERNAMIENTO, HOSPITAL  
REGIONAL DEL CUSCO – 2019**

---

**TESIS PRESENTADA POR:**

Bach. DURAN BACA ANA MARIA

Bach. RAMOS TTITO JHOMMI

**Para optar al título profesional de:**

LICENCIADA EN ENFERMERÍA

**ASESORA:**

Dra. SARA BATALLANOS NEME

**CUSCO - PERÚ**

**2021**

## RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado “Lesiones dérmicas por uso de adhesivos sanitarios relacionadas a las características clínicas de los pacientes en servicios de internamiento, Hospital Regional del Cusco – 2019” cuyo Objetivo fue: Establecer la relación existente entre las lesiones dérmicas por uso de adhesivos sanitarios y las características clínicas de los pacientes en servicios de internamiento, Hospital Regional del Cusco – 2019. Metodología: Estudio descriptivo, transversal y correlacional, con una población y muestreo no probabilístico intencionado de 276 pacientes considerando los criterios de inclusión y exclusión de Cirugía, Medicina, UCI, y Traumatología. La técnica de investigación fue la observación; y el instrumento la guía de observación que fue sometida a validez de contenido por juicio de expertos con un 2.182 de DPP, con su confiabilidad respectiva de 0.781, para el análisis de datos se utilizó Excel y el SPSS V22. Resultados: respecto a las características generales el 58% de los pacientes son femenino el 63.8% tienen edades entre 30 a 59 años y el 47.8% de cirugía. Siendo las lesiones por adhesivos sanitarios más predominantes las peladuras (73.91%) En cuanto a las características clínicas de los pacientes en su mayoría son de piel mixta (36.7%), de fototipo IV (68,8%), regular estado de hidratación (53.6%), de estado nutricional normal (55%), con grado de dependencia con apoyo (52%), y con el adhesivo ubicado en miembros superiores en inferiores, estos adhesivos en su mayoría son de tela (73.91) La lesión más frecuente, la peladura, fue en el sexo masculino, adultos, en cirugía, en piel seca, fototipo IV. Conclusión: Se acepta la hipótesis para las variables: tipo de piel, dependencia, zona de aplicación, tipo de adhesivo por ser  $p > 0.05$ .

**Palabras claves:** prevalencia, lesión dérmica, adhesivo sanitario, características clínicas, grado de dependencia, fototipo, látex