

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



“FACTORES ASOCIADOS A BAJO PESO AL NACER EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO, CUSCO 2015”

Tesis presentada por:

ELVIS QUISPE SALCEDO

**Para optar al Título Profesional de:
MEDICO CIRUJANO**

Asesor:

**MG RUBEN DARIO ESCALANTE
GUZMAN**

Cusco, Marzo de 2016

RESUMEN

Objetivos: Determinar los factores asociados al bajo peso al nacer Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, Cusco 2015.

Metodología: Se realizó un estudio analítico, retrospectivo, de casos y controles, de corte transversal en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco del Cusco durante el año 2015; los datos se tomaron de los libro de partos, libro de neonatología, se obtuvo una población de recién nacidos de los cuales se obtuvieron 64 casos y 192 controles, se evaluaron las variables: edad materna, grado de instrucción, estado civil, HTA inducida por el embarazo, infección urinaria, ruptura prematura de membrana, paridad, número de controles prenatales, edad gestacional, antecedente de RN con BPN, se evaluó la muestra con el programa SPSS V22.0

Resultados: Se encontró que la incidencia de bajo peso al nacer en la población estudiada fue del 5,45%, el promedio de peso de los recién nacidos fue $2955,40 \pm 519,73$; de los recién nacidos de sexo femenino fue de: $2928,05 \pm 499,395$ gr. y recién nacidos de sexo masculino, $2992,09 \pm 546,773$ gr. Los factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer fueron: hipertensión inducida por el embarazo (OR = 10,333; $p < 0,005$), edad materna menor a 19 años (OR = 5,339; $p < 0,005$), infección urinaria (OR = 3,807; $p < 0,005$) y control prenatal inadecuado (OR = 2,655; $p < 0,005$), no mostraron significación estadística los factores, ruptura prematura de membrana, antecedente de haber tenido un hijo con bajo peso al nacer, paridad, grado de instrucción, estado civil

Conclusiones: La incidencia de bajo peso al nacer en La población estudiada fue 5,45%, los factores asociados a bajo peso al nacer son: hipertensión inducida por el embarazo, edad materna menor a 19 años, infección urinaria y control prenatal inadecuado

Palabras claves: Bajo peso al nacer