

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



Titulo de tesis:

"Factores asociados a Hiperémesis Gravídica, Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, Cusco, 2017 – 2018."

Presentado por:

Condori Mamani Alfredo

Para optar el título profesional de:

Médico Cirujano

Asesor:

Dr. Nicolas Edgardo Mauricio Agurto

Cusco, Marzo del 2019

RESUMEN

FACTORES ASOCIADOS A HIPEREMESIS GRAVIDICA, HOSPITAL NACIONAL ADOLFOGUEVARA VELASCO, CUSCO, 2017-2018.

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a hiperémesis gravídica en gestantes del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, Cusco 2017 - 2018.

Métodos: Estudio analítico, observacional, retrospectivo, de casos y controles. Consta de una población 160 gestantes del servicio de Gineco-obstetricia del hospital nacional Adolfo Guevara Velasco durante los años de 2017-2018. Se contó con 80 casos y 80 controles. La información se obtuvo de una ficha de recolección de datos. Se utilizaron los métodos estadísticos de asociación (OR) y Chi cuadrado con un nivel de significancia estadística menor a 0.05% y un intervalo de confianza de 95%.

Resultados: Dentro de los factores maternos relacionados a hiperémesis gravídica se encontró a edad materna { $p = 0.002$, OR = 1.5 (IC 95% 1.2 – 5.4)}, paridad { $p = 0.002$, OR = 1.35 (IC 95% 1.27 – 5.1)}, antecedente de hiperémesis gravídica { $p = 0.003$, OR = 3.33 (IC 95% 1.92 – 7.92)} e historia familiar de hiperémesis gravídica { $p = 0.001$, OR = 1.58 (IC 95% 0.32 – 3.15)}. Dentro de los factores propios de la gestación relacionados a hiperémesis gravídica se encontró a sexo del producto de gestación femenino: { $p = 0.001$, OR = 3.22 (IC 95% 1.65 – 5.18)} y a problemas psicológicos { $p = 0.001$, OR = 2.25 (IC 95% 1.82 – 5.08)}.

Conclusiones: La edad materna, paridad, antecedente de hiperémesis gravídica, historia familiar de hiperémesis gravídica, , sexo femenino del producto de gestación, problemas psicológicos se asociaron a hiperémesis gravídica en gestantes de Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, Cusco, 2017-2018.

Palabras clave: Hiperémesis gravídica, factores de riesgo

ABSTRACT

FACTORS ASSOCIATED WITH GRAVIDIC HYPEREMESIS, NATIONAL HOSPITAL ADOLFOGUEVARA VELASCO, CUSCO, 2017-2018.

Objective: To determine the risk factors associated with hyperemesis gravidarum in pregnant women of Adolfo Guevara Velasco National Hospital, Cusco 2017 - 2018.

Methods: Analytical, observational, retrospective, case and control study. It consists of a population of 160 pregnant women of the Obstetrics and Gynecology service of the Adolfo Guevara Velasco National Hospital during the years of 2017-2018. There were 80 cases and 80 controls. The information was obtained from a data collection form. We used statistical methods of association (OR) and Chi square with a level of statistical significance less than 0.05% and a confidence interval of 95%.

Results: Among the maternal factors related to hyperemesis gravidarum, maternal age was found { $p = 0.002$, OR = 1.5 (95% CI 1.2 - 5.4)}, parity ($p = 0.002$, OR = 1.35 (95% CI 1.27 - 5.1). }), history of hyperemesis gravidarum { $p = 0.003$, OR = 3.33 (95% CI 1.92 - 7.92)} and family history of hyperemesis gravidarum { $p = 0.001$, OR = 1.58 (95% CI 0.32 - 3.15)}. Among the factors related to gestation related to hyperemesis gravidarum, the sex of the female pregnancy product was found: { $p = 0.001$, OR = 3.22 (95% CI 1.65 - 5.18)} and psychological problems { $p = 0.001$, OR = 2.25 (95% CI 1.82 - 5.08)}.

Conclusions: Maternal age, parity, history of hyperemesis gravidarum, family history of hyperemesis gravidarum, female sex of the pregnancy product, psychological problems were associated with hyperemesis gravidarum in pregnant women of Adolfo Guevara Velasco National Hospital, Cusco, 2017-2018.

Key words: Hyperémesis gravídica, risk factors