

**UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL
CUSCO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA**



**“RELACION ENTRE EL TIPO DE LACTANCIA Y LA
PRESENCIA DE MALOCLUSIONES DENTARIAS, EN
NIÑOS DE 3 - 5 AÑOS, CENTRO DE SALUD SAN
SEBASTIAN - CUSCO 2019”.**

TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE CIRUJANO DENTISTA

Presentado por:

Bach. Delsi Tapara Cordova

Asesora:

Dra: María Elena Zvietcovich Guerra

Cusco, Perú

2019

RESUMEN

Objetivo: El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre el tipo de lactancia y la presencia de maloclusiones dentarias, en niños de 3 – 5 años del Centro de Salud de San Sebastián - Cusco. **Metodología:** Estudio de tipo correlacional, observacional y diseño de la investigación transversal. La muestra de estudio estuvo conformada por 139 niños de 3- 5 años del centro de Salud de San Sebastián – Cusco. El tipo y tiempo de lactancia se determinó mediante una encuesta (cuestionario de respuesta indirecta), dirigida a las madres que asistían al servicio de CRED de dicho establecimiento; los datos acerca de la presencia de maloclusiones, se obtuvo mediante el examen clínico bucal a los niños de 3 a 5 años y se registraron en una ficha de recolección de datos, confeccionado según criterios de maloclusión de la OMS y la universidad de Sao Paulo, modificada a propósito de la investigación y ordenados según grados de severidad de maloclusiones en dentición decidua.

Para el análisis se utilizó la prueba del Chi cuadrado, a un nivel de confianza del 95 % y error del 5%. **Resultados:** El tipo de lactancia que predominó fue lactancia mixta 81.3% y prevaleció la presencia de maloclusiones 58,99 % del total de la muestra. En el análisis de la relación entre el tipo de lactancia y la presencia de maloclusiones, a un nivel de confianza del 95% con un nivel de significancia o error tipo $\alpha = 5\% = 0,05$, resultó $p = 0,022$, que indicó una relación estadísticamente significativa entre el tipo de lactancia y la presencia de maloclusiones, ya que con una lactancia materna exclusiva se encontró menor frecuencia de maloclusiones que a comparación de una lactancia mixta y artificial. En el análisis de la relación entre el tiempo de lactancia materna exclusiva y mixta con la presencia de maloclusiones, se encontró una relación estadísticamente significativa $p < 0,05$, dicha relación es inversamente proporcional ya que con un tiempo de lactancia materna exclusiva y mixta hasta los 24 meses o más hubo menor presencia de maloclusiones. Sin embargo, en el tiempo de lactancia artificial no se encontró relación estadísticamente significativa con la presencia de maloclusiones. **Conclusiones:** Si existe relación estadísticamente significativa entre el tipo de lactancia y la presencia de maloclusiones, de igual manera entre el tiempo de lactancia materna exclusiva y mixta con la presencia de maloclusiones. No se encontró relación estadísticamente significativa entre el tiempo de lactancia artificial y la presencia de maloclusiones.

Palabras clave: Lactancia, tipo de lactancia, tiempo de lactancia, maloclusión.