

**Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco**

**Facultad de Ciencias de la Salud**

**Escuela Profesional de Medicina Humana**



**TESIS**

**“PERTINENCIA E INDICACIONES DE CESAREAS EN EL HOSPITAL  
REGIONAL CUSCO, PERIODO 2018 - 2021”**

**Para optar el título profesional de Médico Cirujano  
presentado por:**

**Bach. Percy Yony Rojas Laura**

**Asesor:**

**Dra. Roxana Isabel Quispe Chalco**

**Cusco-Perú**

**2022**

## RESUMEN

### “PERTINENCIA E INDICACIONES DE CESÁREAS EN EL HOSPITAL REGIONAL CUSCO, PERIODO 2018 -2021”

**Rojas Laura, Quispe Chalco R.**

**Antecedentes:** La cesárea es uno de los procedimientos quirúrgico más frecuentes realizados en la mujer, y su tasa sigue en aumento sobre todo en países de ingresos altos y medio. Este procedimiento está justificado cuando está en riesgo la vida tanto de la madre como del neonato, sin embargo, no está exento a los daños que puede producir, por lo cual solo debe realizarse cuando está justificada.

**Métodos:** Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de corte transversal. La información se obtuvo de las historias clínicas a través de una ficha de recolección de datos de gestantes cesareadas en el servicio de maternidad del Hospital Regional Cusco en el periodo 2018 - 2021, y los datos se tabularon en Microsoft Excel 2019, y SPSS versión 25.0 para su análisis y los resultados se representaron como frecuencias, porcentajes y medias.

**Resultados:** De un total de 384 pacientes estudiados, la edad promedio es de 28.25 años; el 72.4% se hace de forma pertinente; las indicaciones más frecuentes fueron: el 20.7% anomalías de presentación, 15.9% cesárea previa, 11.2% desproporción cefalopelvica. El 85.7% fue cesárea de emergencia. Según la clasificación de Robson: 31.5% fue del grupo 5, 19.5% de grupo 1, y 10.2% en grupo 3; y la tasa de cesárea vario en los diferentes años siendo el más alto en el año 2018 con 70.9% y el más bajo en el año 2021 con 33.8%.

**Conclusiones:** La tasa de cesárea en el Hospital Regional Cusco es muy superior a la recomendada por la OMS que es de 10 – 15% y esto se debe al alto porcentaje de cesáreas innecesarias.

**Palabras clave:** Pertinencia, Tasa de cesáreas, Indicación de cesáreas.