


**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO**

**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
CARRERA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA**



TESIS

**PREVALENCIA DE LA PÉRDIDA PREMATURA DE MOLARES TEMPORALES
EN ESCOLARES DE 6 A 9 AÑOS DE I.E.E.PRIMARIAS DEL DISTRITO DE
ANTA - 2014**

**PRESENTADO POR:
DAVID MODESTO MOZO PALMA**

**TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE
CIRUJANO DENTISTA**

**ASESOR:
Mgt. CESAR A. ARBIETO**

**CUSCO – PERÚ
2015**

PREVALENCIA DE LA PÉRDIDA PREMATURA DE MOLARES TEMPORALES EN ESCOLARES DE 6 A 9 AÑOS DE I.E.E. PRIMARIAS DEL DISTRITO DE ANTA - 2014

RESUMEN

Objetivo: El propósito de este estudio fue determinar la prevalencia de la pérdida prematura de molares temporales en escolares de 6 a 9 años del distrito de Anta, 2014.

Método: El presente estudio tiene diseño no experimental, observacional y descriptivo de corte transversal con una muestra de 202 estudiantes de 6 a 9 años de Instituciones Educativas Estatales Primarias del distrito de Anta - 2014

Resultados: En la presente investigación la prevalencia de pérdida prematura de molares temporales en niños de 6 a 9 años fue del 69.3%, el 100% de la pérdida prematura de molares temporales fue a causa de caries dental. Las segundas molares temporales inferiores (7.5 y 8.5) fueron la que se perdieron con mayor frecuencia con un 17.4% y 17% respectivamente, el maxilar inferior fue el más afectado con un 68.1% de pérdidas prematuras de molares temporales, el sexo femenino fue el más afectado con 73.8%, en cuanto a la edad, el grupo etario de 6 años es el más afectado con 78.9%, en cuanto al grado de instrucción el grupo más afectado fueron aquellos cuyos padres tienen sólo primaria completa con 78.9%, no existe asociación estadísticamente significativa para ninguna de estas variables.

Palabras clave: *Prevalencia, Caries Dental, Pérdida prematura de molares temporales*