


UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO  
ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



TESIS

INFLUENCIA DE LOS DETERMINANTES SOCIO-  
BIOLÓGICOS EN LA INTERRUPCION TEMPRANA DE LA  
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA DEL MENOR DE 0 - 6  
MESES DE EDAD DEL C.S. TTIO ENERO - DICIEMBRE 2014

PARA OPTAR EL TITULO  
PROFESIONAL DE LICENCIADA EN  
ENFERMERÍA

PRESENTADO POR:

BACH. CUTIRE ARONE ELIANA  
BACH. YUPAICCANA CHACCA BERTHA

ASESORA:

MGT. CAYREL G. JIMENEZ PAREDES

CUSCO - PERÚ

2016

## RESUMEN

El presente estudio tiene como **Objetivo:** Caracterizar la influencia de los determinantes socio-biológicos en la interrupción de la lactancia materna exclusiva del menor de 0-6 meses de edad del C.S. Ttio Enero-Diciembre 2014.

**Material y métodos:** El estudio es de tipo descriptivo , explicativo y retrospectivo; cuya población está constituido por 303 historias clínicas y la muestra de estudio es de 95 historias clínicas, que fue determinado mediante la fórmula para población finita que corresponde al tipo de muestreo probabilístico y aleatorio simple; el instrumento utilizado es la ficha de recolección de datos validado por juicio de expertos; siendo (Dpp) = 1.513 que está ubicado en el intervalo C, que indica que el instrumento de investigación se ubica en "adecuación promedio al problema que se desea investigar , y por tanto el instrumento puede ser utilizado . Los datos fueron procesados mediante el paquete estadístico SPSS Versión 22 y luego se sistematizo los diversos gráficos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010. Para el análisis de los datos se utilizó los estadígrafos del Chi-cuadrado, además se consideró las frecuencias y las proporciones. **Resultados:** El 52.6% de madres están comprendidos entre el grupo etario de 20-29 años de edad, 53.7% tienen grado de instrucción superior, 46.3% son de estado civil conviviente y 54.7% corresponde a madres trabajadoras , respecto a la enfermedad de la madre el 78.9% no tiene ninguna enfermedad, 7.4% tienen alergia a medicamentos, en cuanto a las causas de la interrupción de la lactancia 36.8% de las madres no tuvieron ninguna y 30.5% presenta insuficiente producción de leche; 63.2% de los menores de 0-6 meses de edad son de sexo masculino, 55.8% corresponde al grupo etario de 5 a 6 meses de edad, 31.6% representa al no inicio de la lactancia materna mixta antes de los 6 meses de edad y 68.4% inicia la lactancia materna mixta de 0 a 6 meses de edad , de ellos el 26.3% inician desde 3 a 4 meses de edad y 20% menos de 1 mes. **Conclusiones:** Al aplicar el estadígrafo del Chi- cuadrado, el nivel de significancia es  $p < 0.05$ ; por tanto, la enfermedad de la madre, causas de la interrupción de la lactancia, edad de inicio de la lactancia materna mixta, edad gestacional, Apgar a los 5 minutos, enfermedad del menor influye en el tipo de lactancia materna. Por lo que se acepta la hipótesis planteada en el estudio.