

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS EN PRIMIGESTAS  
ADOLESCENTES Y MUJERES EN EDAD IDEAL PARA EMBARAZARSE,  
HOSPITAL ANTONIO LORENA, CUSCO, 2016.**

**Trabajo de Tesis presentado por:**

Lesdi Castro Loayza

**Para optar el Título Profesional  
de Médico Cirujano**

**Asesor:**

Dra. Katia Gladys Catacora Jara

Cusco-Perú

2017

# FRECUENCIA DE COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS EN PRIMIGESTAS ADOLESCENTES Y MUJERES EN EDAD IDEAL PARA EMBARAZARSE, HOSPITAL ANTONIO LORENA, CUSCO, 2016.

## RESUMEN

**OBJETIVO:** Determinar las complicaciones obstétricas más frecuentes en primigestas adolescentes y mujeres en edad ideal para embarazarse en el Hospital Antonio Lorena del Cusco en el periodo 2016.

**DISEÑO:** El presente es un estudio retrospectivo, transversal, comparativo y observacional, en el cual se revisaron 479 registros clínicos de primigestas de 10 a 30 años, divididas en 2 grupos: adolescentes (10 a 19 años) y mujeres en edad ideal para embarazarse (20 a 30 años). Para el análisis se usó frecuencias y la prueba de Chi Cuadrado de Pearson con un intervalo de confianza del 95% y  $p=0.05$ .

**RESULTADOS:** La media de edad en adolescentes fue 17.5 años y de mujeres en edad ideal para embarazarse fue 23.3 años, la media general fue 20.6 años, 41.2% eran adolescentes (0.4% eran adolescentes tempranas (10-13 años), 8.1% eran adolescentes intermedias (14-16 años) y 32.7% eran adolescentes tardías (17-19 años), constituyendo este último el subgrupo mayoritario) y 58.8% eran mujeres en edad ideal para embarazarse. Del total de primigestas, 56.4% estuvieron controladas (6 o más controles prenatales), el embarazo terminó por vía vaginal en 53.4%, en cesárea en 26.7% de ellas y 19.9% correspondió a aborto o embarazo ectópico. En cuanto a procedencia, 56.4% procedían de zonas urbanas y 43.6% procedían de zonas rurales. Respecto a grado de instrucción 63.7% cursaron secundaria y 31.7% cursaron superior como máximo nivel. Según estado civil 76.2% eran convivientes y 21.5% eran solteras. Las complicaciones obstétricas más frecuentes durante el embarazo fueron: infección de tracto urinario en 21.9% y 7.4%, aborto espontáneo en 15.8% y 19.9% y ruptura prematura de membranas en 10.5% y 16.9%; durante el parto: anomalías en la dinámica de trabajo de parto en 10.1% y 22.1% y obstrucciones del trabajo de parto en 15.8% y 4%; y durante el postparto: desgarro perineal en 3.5% y 10.1% en adolescentes y en mujeres en edad ideal para embarazarse respectivamente, todas con una  $p < 0.05$  teniendo diferencia estadística significativa.

**CONCLUSIÓN:** Las complicaciones obstétricas más frecuentes en adolescentes y en mujeres en edad ideal para embarazarse fueron las que ocurrieron durante el embarazo. Se encontró diferencia estadísticamente significativa, siendo la infección de tracto urinario la más frecuente en adolescentes; el aborto espontáneo y la ruptura prematura de membranas las más frecuentes en mujeres en edad ideal para embarazarse.

**Palabras clave:** *Adolescencia, embarazo, embarazo adolescente, edad ideal para embarazarse, primigesta, complicaciones obstétricas.*