

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO
ABAD DEL CUSCO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL
PARTO PRETERMINO EN GESTANTES
ADOLESCENTES DEL HOSPITAL REGIONAL
DEL CUSCO, 2011 – 2016**

**TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO
PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO**

AUTOR:

Bach. Marco Antonio Astorga Oquendo

ASESOR:

Dr. Wilbert Cárdenas Alarcón

CUSCO – PERÚ

2017

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL PARTO PRETERMINO EN GESTANTES ADOLESCENTES DEL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO, 2011-2016

MARCO ANTONIO ASTORGA OQUENDO WILBERT CARDENAS ALARCON

RESUMEN

Objetivo: El presente estudio tiene como objetivo determinar los factores de riesgo asociados al parto pretermino en gestantes adolescentes del Hospital Regional del Cusco, 2011 – 2016.

Material y método: Estudio de diseño no experimental, retrospectivo, analítico de casos y controles. Se estudiaron 81 casos de gestantes adolescentes con el diagnostico de parto pretermino con sus respectivos controles en igual número. Para el análisis de los resultados se usó el paquete estadístico SPSS 23 se usó el Chi cuadrado y el Odds Ratio (OR) con un intervalo de confianza del 95%.

Resultados: La mayoría de gestantes que presentaron parto pretermino eran adolescentes tardías (65.4%), convivientes (61.7%) y con grado de instrucción secundaria (74.1%) se encontró asociación estadísticamente significativa con la edad y el nivel de instrucción. Son factores de riesgo asociados al parto pretermino en gestantes adolecentes: La infección del tracto urinario (OR=7.89), hemorragia durante el embarazo (OR=2.07), anemia (OR=5.69), control prenatal deficiente (OR=20.76), antecedente de amenaza de parto pretérmino (OR=10.95) y la ruptura prematura de membrana (OR= 20.80).

Conclusiones: Los factores de riesgo asociados al parto pretérmino en las gestantes adolescentes en el hospital y periodo de estudio fueron La edad, el nivel de instrucción, la infección del tracto urinario, hemorragia durante el embarazo, anemia, control prenatal deficiente, antecedente de amenaza de parto pretérmino y ruptura prematura de membrana.

Palabras claves: Factores de riesgo, parto pretermino, adolescente.