

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



**“FACTORES RELACIONADOS A LA ADHERENCIA DE LA
SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES EN NIÑOS
DE 6 A 36 MESES DEL CENTRO DE SALUD DE POMACANCHI
2017”**

Tesis presentada por:

Bachiller: Farfán Cárdenas Liliana Julia

Para optar al título profesional de:

Licenciada en Enfermería

Asesora:

Docente: Judith G. Espezúa Montes De
Oca

CUSCO - PERÚ

2017

RESUMEN

"FACTORES RELACIONADOS A LA ADHERENCIA DE LA SUPLEMENTACION CON MULTIMICRONUTRIENTES EN NIÑOS DE 6 A 36 MESES DEL CENTRO DE SALUD DE POMACANCHI 2017". **Objetivo:**

Determinar la relación entre los factores de la madre, del niño de 6 a 36 meses, del personal de Enfermería y la adherencia a la suplementación con multimicronutrientes del Centro de Salud de Pomacanchi 2017. **Diseño**

metodológico: Descriptivo, correlacional y transversal, constituido por una población de 74 niños de 6 a 36 meses, 74 madres y 5 Licenciados (as) de Enfermería. La recolección de la información se hizo mediante una entrevista estructurada, una guía de observación y una ficha de recolección de datos sobre los factores de la madre, del niño de 6 a 36 meses y del personal de enfermería. Los cuales fueron validados por juicio de expertos; Para el análisis de datos se hizo uso del chi cuadrado. **Resultados:** Se halló que el 67,6% de madres son de grado de instrucción primario, el 95,9% de los niños poseen entre 6 a 18 meses de edad y en su mayoría son de sexo femenino, el 59,46% del personal de enfermería recibió capacitación, el nivel cognitivo de las madres fue regular en un 47,3%, además tuvieron una actitud negativa en un 83,8%, dentro de los factores del niño, el 62,16% presentó desnutrición, el 71,62% no consume el preparado, el 55,41% presentó estreñimiento, y el 60,82% presentó enfermedades durante la suplementación. Respecto a los factores del personal de Enfermería, un 50,0% brindó una deficiente consejería y un 81,1% no realiza visitas domiciliarias. En cuanto a la adherencia, el 83,8% presentó una baja adherencia a la suplementación. **Conclusión:** Al aplicar el estadígrafo del chi cuadrado, el nivel de significancia ($p < 0,05$); por tanto existe relación significativa entre el factor cognitivo y actitudinal de la madre, los efectos colaterales, las enfermedades del niño, las visitas domiciliarias del personal de salud con la adherencia a la suplementación con multimicronutrientes; Sin embargo no tiene relación con la consejería que brinda el personal de enfermería ni con el estado nutricional del niño.

Palabras clave: Adherencia, suplementación, multimicronutriente, niño de 6 a 36 meses, factores.