

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



TESIS:

“FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE CÁNCER GÁSTRICO EN PACIENTES DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO DEL CUSCO, 2013-2018”

PRESENTADO POR:

Bach. ERIC PAUCAR PAZ

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

ASESOR:

Dr. HÉCTOR PAUCAR SOTOMAYOR

CUSCO – PERÚ

2019

RESUMEN

OBJETIVO: Analizar los factores asociados al desarrollo de cáncer gástrico en pacientes del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco del Cusco, 2013-2018

MATERIAL Y MÉTODOS: Tipo de estudio retrospectivo, transversal, analítico, observacional y diseño de estudio casos y controles. Se estudiaron 100 historias clínicas que cumplieron con los criterios de inclusión de pacientes atendidos en la unidad de gastroenterología del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco del Cusco entre el 2013-2018, la mitad de ellos tenían diagnóstico endoscópico e histopatológico de cáncer gástrico (casos) y la otra mitad no lo tenían (controles). La información se recolectó de las historias clínicas mediante una ficha de recolección de datos.

RESULTADOS: El análisis descriptivo mostró: Edad en el grupo de casos ($65,3 \pm 14,6$), sexo masculino en el grupo de casos (58%), IMC en el grupo de casos ($26,1 \pm 4,5$), gastritis superficial, en grupo de casos (74%). El análisis bivariado evidencio: Edad OR=8,6 (3,06-25,24) $p=0,005$, sexo: OR= 2,93 (1,20-7,23), IMC mayor a 25 OR= 0,29 (0,12-0,71) $p=0,0027$, grupo sanguíneo A OR=3,91 (0,69-4,00) $p=0,0806$, grado de instrucción secundaria o superior OR=0,53 (0,19-1,43) $p=0,1713$, *H. pylori* OR=0,28 (0,11-1,69) $p=0,0023$, gastritis crónica superficial OR=12,97 (4,54-38,19) $p=0,001$, gastritis crónica atrófica OR=5,23 (1,83-16,22) $p=0,0005$, metaplasia OR=20,44 (4,37-186,72) $p=0,0005$, displasia OR=17,38 (3,70-159,41) $p=0,001$, antecedente familiar de cáncer gástrico OR=4,57 (0,84-45,89) $p=0,001$, antecedente de otro tipo de cáncer OR=4,57 (0,84-45,89) $p=0,0455$, consumo de alcohol OR=7,07 (2,23-12,62) $p=0,001$.

CONCLUSIONES: La gastritis crónica superficial, gastritis crónica atrófica, metaplasia, displasia, antecedente familiar de cáncer gástrico, grupo sanguíneo A, consumo de alcohol, edad, sexo son factores de riesgo.

PALABRAS CLAVE: Cáncer gástrico, factor asociado, factor de riesgo, factor de protección.