

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



CONDICIONANTES MATERNO-NEONATALES Y PÉRDIDA DE PESO CORPORAL EN RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO CENTRO DE SALUD DE POMACANCHI, 2018.

TESIS PRESENTADO POR:

Bach. Rodriguez Rojas Xiomara Stefany

Para optar al título profesional de Lic. en Enfermería

ASESORA:

Dra. Nelly Aydee Cavero Torre

Cusco-Perú

2020

RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado “Condicionantes materno-neonatales y pérdida de peso corporal en recién nacidos a término Centro de salud de Pomacanchi, 2018”. **Objetivo:** Establecer la relación que existe entre los condicionantes materno-neonatales y la pérdida de peso corporal a las 48 horas de vida en recién nacidos a término en el Centro de Salud de Pomacanchi Enero-Septiembre 2018. **Diseño metodológico:** Estudio Correlacional, descriptivo - retrospectivo, la población en estudio quedo constituido por 50 historias clínicas materno-neonatales del Centro de salud Pomacanchi, 2018. Se aplicó una ficha de recolección de datos sobre condicionantes maternos y neonatales, validado por juicio de expertos; la confiabilidad se realizó a través de la prueba estadística del Alfa de Crombach que dió como resultado la cifra de 0,70. Hallándose los siguientes **Resultados:** Se encontró que del total de recién nacidos a término, el 64.0% presentó una pérdida de peso corporal mayor al 5% a las 48 horas. Los condicionantes lactancia materna ineficaz (V de Cramer 0.831; $p=0.00$), edad de la madre (V de Cramer 0.40; $p=0.05$), grado de instrucción (V de Cramer 0.445; $p=0.04$) y paridad de a madre (V de Cramer= 0.616; $p=0.00$) mostraron ser condicionantes relacionados con la pérdida de peso corporal en los recién nacidos a término. El sexo (V de Cramer 0.217, $p=0.31$), APGAR (V de Cramer 0.217, $p=0.31$), contacto piel a piel (V de Cramer 0.062; $p=0.66$), peso de nacimiento (V de Cramer 0.107; $p=0.45$) mostraron no ser condicionantes relacionados con la pérdida de peso corporal en la población de estudio. **Conclusión:** La porcentaje de pérdida de peso en recién nacidos a término en este estudio fue mayor al 5% a las 48 horas, los condicionantes que se relacionaron significativamente fueron lactancia materna ineficaz, edad –grado de instrucción y paridad de la madre. Por lo tanto se acepta la hipótesis planteada sobre la relación que existe entre las variables de estudio

Palabras clave. Recién nacido a término, Pérdida de peso corporal, condicionantes