

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



TESIS:

**“CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS DE LA
ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE EN PACIENTES DEL HOSPITAL
NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO, CUSCO, 2012 – 2017”**

Presentado Por:

JULIO CESAR HUAMÁN OCHOA

Para optar el Título de Médico Cirujano

Asesor:

Dr. GREGORIO CHOQUE MAMANI

Cusco, abril

2018

RESUMEN

“CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS DE LA ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE EN PACIENTES DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO DE CUSCO, 2012 – 2017”

Introducción: La Enfermedad de Ménière (EM) es una patología no muy conocida en nuestro medio por ser muchas veces infradiagnosticada y que consiste en una triada clínica de vértigo, acufenos e hipoacusia. Este trabajo está basado en describir las principales características epidemiológicas de la población que padece esta enfermedad

Objetivo: Determinar las principales características clínico - epidemiológicas de la Enfermedad de Ménière en los pacientes del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco entre los años 2012 – 2017.

Métodos: se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo y de corte transversal realizado en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, mediante la revisión de historias clínicas de 95 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión. Se utilizó fichas de recolección de datos y el programa informático Excel 2013.

Resultados: las edades mayor afectadas fue entre los 40 a 50 años en un 63%, el sexo más afectado fue el femenino en un 66%, el estado civil con mayor afección fueron los casados con 58%. La sintomatología que predominó fue el vértigo en un 100% de los casos, seguido de los acufenos en 92% y la hipoacusia en 83%, el síntoma acompañante más relacionado fue la cefalea en un 58%; la comorbilidad más relacionada fue la hipertensión arterial en un 28%, seguida de la desviación del septum nasal en un 26% y el trastorno ansioso depresivo en un 23%. El oído derecho fue el más afectado que el oído izquierdo, el diagnóstico predominante fue la hipoacusia neurosensorial bilateral en un 50.5%. El 37% de los pacientes requirieron manejo hospitalario el resto solo manejo ambulatorio.

Palabras clave: Vértigo, Hipoacusia, Acufenos, Enfermedad de Ménière, Síndrome de Ménière, Audiometría.