

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



TESIS:

“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS DE PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO, 2017-2021”

Para Optar el Título Profesional de Médico Cirujano

Presentado por:

BACH: SAIHUA TORRES, Henry

Asesor:

Dr. TOLEDO RAMAL, Pedro Alejandro

CUSCO-PERÚ

2022

Resumen

“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS DE PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO, 2019-2021”

Antecedentes: El cáncer de próstata (CP) es una neoplasia hormono-dependiente que constituye la segunda causa de muerte en el hombre a nivel mundial.

Materiales y Métodos: Es un estudio observacional descriptivo de corte transversal, mediante la revisión de historias clínicas, en una población de 176 pacientes tratados en el Hospital Regional Del Cusco del 2017 al 2021. Con una muestra total de 92 pacientes.

Resultados: El cáncer de próstata tuvo una mayor frecuencia en las edades 70 a 79 años (40.22 %), presento antecedente familiar de cáncer de próstata (3.26%) y antecedente de otro tipo de cáncer (6.52%), las comorbilidades más frecuentes fueron antecedente Alcohólico (94.57 %), Hipertensión Arterial (28.26%) y Diabetes Mellitus (18.48), Al examen de tacto rectal el 75% fueron patológicas. Las manifestaciones más frecuentes fueron síntomas irritativos (91.30 %) y obstructivos 84.78%. El 65.21 % tenían un PSA mayor de 20 ng/ml, los estudios imagenológicos más realizados fueron Ecografía RVP (63.04%), Tomografía (50%) y la Gammagrafía ósea tan solo 16.30%, el 99 % de los cánceres de próstata son de extirpe adenocarcinomas, el score de GLEASON 28.26% fueron de grado 4 y 27.17% fueron de grado 5, Estadio clínico más hallado fue EC IV 34.78% y EC III 34.78%; y la modalidad de tratamiento más utilizada fue cirugía 57.61% y hormonoterapia 36.96%.

Conclusiones: El cáncer de próstata afecto más a mayores de 70 años, los antecedentes familiares de cáncer fueron escasos, predominan los antecedentes alcohólicos, hipertensión arterial y diabetes. la mayoría de tactos rectales fueron patológicos, las manifestaciones más frecuentes fueron de sintomatología obstructiva, los PSA se hallaban en valores mayores a los 20ng/ml, las imágenes más solicitadas fueron ecografía RVP y la tomografía, la estirpe adenocarcinoma fue la predominante, el score de GLEASON fue de alto grado, los estadios clínicos avanzados fueron los más frecuentes y la modalidad de tratamiento más usada fue la cirugía y hormonoterapia.

Palabras clave: cáncer de próstata, epidemiología, características clínicas y estadio Clínico.